

WYPEŁNIA ZDAJĄCY

KOD

--	--	--

PESEL

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Miejsce na naklejkę.

Sprawdź, czy kod na naklejce to
M-100.

Jeżeli tak – przyklej naklejkę.
Jeżeli nie – zgłoś to nauczycielowi.

Egzamin maturalny

Formuła 2023

MATEMATYKA

Poziom podstawowy

Symbol arkusza

MMAP-P0-100-2408

DATA: **20 sierpnia 2024 r.**

GODZINA ROZPOCZĘCIA: **9:00**

CZAS TRWANIA: **180 minut**

LICZBA PUNKTÓW DO UZYSKANIA: **46**

WYPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY

Uprawnienia zdającego do:

- ☐ dostosowania zasad oceniania
- ☐ dostosowania w zw. z dyskalkulią
- ☐ nieprzenoszenia odpowiedzi na kartę.

Przed rozpoczęciem pracy z arkuszem egzaminacyjnym


1. Sprawdź, czy nauczyciel przekazał Ci **właściwy arkusz egzaminacyjny**, tj. arkusz we **właściwej formule**, z **właściwego przedmiotu** na **właściwym poziomie**.
2. Jeżeli przekazano Ci **niewłaściwy** arkusz – natychmiast zgłoś to nauczycielowi. Nie rozrywaj banderol.
3. Jeżeli przekazano Ci **właściwy** arkusz – rozerwij banderole po otrzymaniu takiego polecenia od nauczyciela. Zapoznaj się z instrukcją na stronie 2.





Instrukcja dla zdającego

1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 31 stron (zadania 1–30). Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin.
2. Na pierwszej stronie arkusza oraz na karcie odpowiedzi wpisz swój numer PESEL i przyklej naklejkę z kodem.
3. Symbol  zamieszczony w nagłówku zadania oznacza, że rozwiązanie zadania zamkniętego musisz przenieść na kartę odpowiedzi. Ocenie podlegają wyłącznie odpowiedzi zaznaczone na karcie odpowiedzi.
4. Odpowiedzi do zadań zamkniętych zaznacz na karcie odpowiedzi w części karty przeznaczonej dla zdającego. Zamaluj  pola do tego przeznaczone. Błędne zaznaczenie otocz kółkiem  i zaznacz właściwe.
5. Pamiętaj, że pominięcie argumentacji lub istotnych obliczeń w rozwiązaniu zadania otwartego może spowodować, że za to rozwiązanie nie otrzymasz pełnej liczby punktów.
6. Rozwiązania zadań i odpowiedzi wpisuj w miejscu na to przeznaczonym.
7. Pisz czytelnie i używaj tylko długopisu lub pióra z czarnym tuszem lub atramentem.
8. Nie używaj korektora, a błędne zapisy wyraźnie przekreśl.
9. Nie wpisuj żadnych znaków w tabelkach przeznaczonych dla egzaminatora. Tabelki umieszczone są na marginesie przy odpowiednich zadaniach.
10. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie będą oceniane.
11. Możesz korzystać z *Wybranych wzorów matematycznych*, cyrkla i linijki oraz kalkulatora prostego. Upewnij się, czy przekazano Ci broszurę z okładką taką jak widoczna poniżej.



**Zadania egzaminacyjne są wydrukowane
na następnych stronach.**

Liczba wszystkich całkowitych rozwiązań nierówności $|x + 1| < 3$ jest równa


- A.** 2 **B.** 3 **C.** 5 **D.** 7

[illegible]

Liczba $\left(\frac{4}{25}\right)^{-0,5}$ jest równa

- A.** 0,04 **B.** 0,8 **C.** 2,5 **D.** 0,4

Brudnopis


A large grid of graph paper, consisting of 20 columns and 20 rows of squares, intended for writing or drawing.

Zadanie 3. (0–2)

Wykaż, że dla każdej liczby naturalnej $n \geq 1$ liczba $(2n + 5)^2 + 3$ jest podzielna przez 4.

3.

0–1–2



Zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności

$$\frac{3(6-x)}{17} \leq 3$$

A. $(-\infty, -11)$

B. $(-\infty, -11]$

C. $(-11, +\infty)$

D. $[-11, +\infty)$

Brudnopis



Równanie $\frac{x(x+5)(2-x)}{2x+4} = 0$ w zbiorze liczb rzeczywistych ma dokładnie

A. dwa rozwiązania: (-5) oraz 2 .

B. dwa rozwiązania: (-5) oraz 0 .

C. trzy rozwiązania: (-5) , 0 oraz 2 .

D. cztery rozwiązania: (-5) , (-2) , 0 oraz 2 .


Brudnopis

0-1-
2-3

Rozwiąż równanie


Zapisz obliczenia.

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.



Zadanie 8. (0–1)

Na rysunku, w kartezjańskim układzie współrzędnych (x, y) , przedstawiono interpretację geometryczną jednego z poniższych układów równań A–D.




Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Układem równań, którego interpretację geometryczną przedstawiono na rysunku, jest

- A. $\begin{cases} y = x + 2 \\ y = 2x - 3 \end{cases}$
- B. $\begin{cases} y = -x + 2 \\ y = 2x - 3 \end{cases}$
- C. $\begin{cases} y = x + 2 \\ y = -2x - 3 \end{cases}$
- D. $\begin{cases} y = -x + 2 \\ y = 2x + 3 \end{cases}$

Brudnopis



Zadanie 11.

Pusta bańka na mleko o pojemności 10 litrów ma masę 6,5 kg.

Jeden litr mleka ma masę 1,03 kg.

Niech x oznacza liczbę litrów mleka w tej bańce, a $f(x)$ oznacza wyrażoną w kilogramach masę bańki wraz z mlekiem, gdzie $x \in [0, 10]$.

Zadanie 11.1. (0–1)

Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Funkcja f jest malejąca.	P	F
Funkcja f nie ma miejsc zerowych.	P	F

Brudnopis

Zadanie 11.2. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Największa wartość funkcji f jest równa

A. 16,8

B. 15,8

C. 11,3

D. 10,3

Brudnopis

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Funkcja f jest określona wzorem


- A.** $f(x) = 6,5x + 1,03$
B. $f(x) = 1,03x + 10$
C. $f(x) = 10x + 1,03$
D. $f(x) = 1,03x + 6,5$

Brudnopis

[illegible]

Zadanie 12.

W kartezjańskim układzie współrzędnych (x, y) przedstawiono fragment paraboli, która jest wykresem funkcji kwadratowej f (zobacz rysunek). Wierzchołek tej paraboli oraz punkty przecięcia paraboli z osią Ox układu współrzędnych mają obie współrzędne całkowite.



Zadanie 12.1. (0-1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Zbiorem wartości funkcji f jest przedział

- A.** $(-\infty, -2]$ **B.** $[1, +\infty)$ **C.** $[-1, 3]$ **D.** $[-2, +\infty)$

Brudnopis

Zadanie 12.2. (0-1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Osia symetrii wykresu funkcji f jest prosta o równaniu

- A.** $x = 1$ **B.** $y = 1$ **C.** $x = -2$ **D.** $y = -2$

Brudnopis

Funkcja f jest określona wzorem

D. $f(x) = \frac{1}{2}(x + 1)^2 - 2$

Brudnopis

Zadanie 15. (0–1)

Trzywyrazowy ciąg $(2m - 5, 4, 9)$ jest arytmetyczny.

Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź A albo B oraz odpowiedź 1., 2. albo 3.

Ten ciąg jest

A.	rosnący	oraz	1.	$m = -1$
			2.	$m = 2$
B.	malejący		3.	$m = 3$

Brudnopis

Zadanie 16. (0–1)

Kąt α jest ostry oraz $\cos \alpha = \frac{24}{25}$.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Tangens kąta α jest równy

A. $\frac{7}{18}$

B. $\frac{7}{24}$

C. $\frac{7}{25}$

D. $\frac{18}{25}$

Brudnopis

Długość przeciwprostokątnej AB tego trójkąta jest równa

- A. 18** **B. 20** **C. 24** **D. 25**

[illegible]

Dany jest trójkąt ABC , w którym $|AB| = 5$, $|AC| = 2$ oraz $\cos \angle BAC = \frac{3}{5}$.


Długość boku BC tego trójkąta jest równa

- A. $\sqrt{17}$ B. $\sqrt{23}$ C. $\sqrt{35}$ D. $\sqrt{41}$

[illegible]

Zadanie 19. (0–1)

Punkty K , L oraz M leżą na okręgu o środku w punkcie S . Miara kąta KSM jest równa 160° (zobacz rysunek).



Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Miara kąta wpisanego KLM jest równa


A. 80°

B. 90°

C. 100°


D. 110°

Brudnopis





Zadanie 20. (0–2)

Podstawy trapezu prostokątnego $ABCD$ mają długości: $|AB| = 12$ oraz $|CD| = 6$. Wysokość AD tego trapezu ma długość 24. Na odcinku AD leży punkt E taki, że $|\angle BEA| = |\angle CED|$ (zobacz rysunek).




Oblicz długość odcinka BE . Zapisz obliczenia.






Zadanie 21. (0–4)

W kartezjańskim układzie współrzędnych (x, y) przekątne równoległoboku $ABCD$ przecinają się w punkcie $S = (9, 11)$. Bok AB tego równoległoboku zawiera się w prostej o równaniu $y = \frac{1}{2}x - 1$, a bok AD zawiera się w prostej o równaniu $y = 2x - 4$.

21.0–1–
2–3–4**Oblicz współrzędne wierzchołka B . Zapisz obliczenia.**



$$k: y = (3m - 2)x - 2$$

$$l: y = (2m + 4)x + 2$$

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Proste k oraz l są równoległe, gdy liczba m jest równa

- A.** (-6) **B.** (-2) **C.** 2 **D.** 6

[illegible]

W kartezjańskim układzie współrzędnych (x, y) odcinek o końcach $A = (-4, 7)$ oraz $B = (6, -1)$ jest średnicą okręgu $\mathcal{O}$.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Okrąg $\mathcal{O}$ jest określony równaniem

- A.** $(x - 1)^2 + (y - 3)^2 = 41$
B. $(x - 5)^2 + (y + 4)^2 = 41$
C. $(x - 1)^2 + (y + 3)^2 = 41$
D. $(x - 5)^2 + (y - 4)^2 = 41$

[illegible]

Liczba wszystkich wierzchołków tego ostrosłupa jest równa

- A. 10** **B. 11** **C. 12** **D. 13**

[illegible]

Długości trzech wychodzących z jednego wierzchołka krawędzi prostopadłościanu są trzema kolejnymi liczbami naturalnymi parzystymi. Najdłuższa krawędź tego prostopadłościanu ma długość 10.


Pole powierzchni całkowitej tego prostopadłościanu jest równe

- A. 376** **B. 466** **C. 480** **D. 720**

[illegible]

Zadanie 26. (0–1)

Dany jest prostopadłościan $ABCDEFGH$, w którym podstawy $ABCD$ i $EFGH$ są kwadratami o boku długości 6. Przekątna BH tego prostopadłościanu tworzy z przekątną AH ściany bocznej $ADHE$ kąt o mierze 30° (zobacz rysunek).



Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Przekątna BH tego prostopadłościanu ma długość równą


A. $4\sqrt{3}$

B. $6\sqrt{3}$

C. 12

D. $12\sqrt{2}$

Brudnopis



Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych, w których zapisie dziesiętnym cyfra dziesiątek jest o 3 większa od cyfry jedności, jest

A. 3 **B.** 6 **C.** 7 **D.** 13

[illegible]

Zadanie 28. (0–1) 

W tabeli zestawiono liczbę punktów uzyskanych przez 32 uczniów pewnej klasy za rozwiązanie jednego z zadań testu z matematyki.

Liczba punktów	0	1	2	3	4	5
Liczba uczniów	2	2	5	6	11	6

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Średnia arytmetyczna liczby punktów uzyskanych za rozwiązanie tego zadania przez uczniów tej klasy jest równa

A. 2,5 **B. 3,25** **C. 3,31** **D. 4**

[illegible]

Zadanie 29. (0–2)

Dane są dwa zbiory: $C = \{0, 4, 5, 7, 9\}$ oraz $D = \{1, 2, 3\}$.

Losujemy jedną liczbę ze zbioru C , a następnie losujemy jedną liczbę ze zbioru D .

29.**0–1–2**


Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A polegającego na tym, że suma wylosowanych liczb będzie większa od 9. Zapisz obliczenia.

Zadanie 30. (0–3)


Suma dwóch nieujemnych liczb rzeczywistych x oraz y jest równa 12.


Wyznacz x oraz y , dla których wartość wyrażenia $2x^2 + y^2$ jest najmniejsza.
Oblicz tę najmniejszą wartość. Zapisz obliczenia.

30.

0–1–
2–3

BRUDNOPIS (nie podlega ocenie)





MATEMATYKA

Poziom podstawowy

Formuła 2023



MATEMATYKA

Poziom podstawowy

Formuła 2023



MATEMATYKA

Poziom podstawowy

Formuła 2023

